

Stations et espèces nouvelles pour la Flore valaisanne

Lathyrus aphaca L., champs de Leytron-Riddes (Jaccard), nouveau pour le Valais.

Lathyrus hirsutus L., qui n'avait pas été revu depuis Murith, retrouvé à Martigny par Ph. Farquet.

Vicia hybrida L., Evionnaz (Comte), Ecône, Riddes, Leytron (Jacc.)

Vicia peregrina L., champ à Ecône (Jacc.), nouveau pour le Valais.

Alchemilla conjuncta Bab., en superbes échantillons sur l'arête des Fornets, immédiatement au-dessus du Col de Coux (Jacc.)

Bifora radians Bieb., champ à Leytron (Jacc.), nouveau pour le Valais.

Filago minima Fr., que Jaccard mettait en doute en 1895 à cause de l'indication Mont Fully, était récolté en 1896 déjà par Schinz (in litt) au dessus des Follatères ; trouvé en grande quantité à Ravoire, plus. loc., par Ph. Farquet 1912.

Euphorbia segetalis L., Cette rare espèce, qui n'avait plus été signalée depuis les Thomas et Murith, a été retrouvée par moi dans les vignes sous Lens, en face de la station de Granges, 1911 et en abondance dans un champ entre Leytron et Riddes, juin 1912.

Mais la découverte la plus intéressante est celle du

Pisum elatius M. B., que notre jeune et zélé collègue, M. Ph. Farquet, a découvert le 1^{er} mai dans un fourré d'épines sur sol rocheux, entre le Creux du Loup et le Mayen à Loton sur Fully, 870 mètres environ. Cette espèce, caractérisée surtout par ses petites *graines sphériques*, — récoltées par moi le 4 août — vert olive, marbrées de pourpre brun, y est assez abondante. La flore de Grenier et Godron l'indique en France dans des stations semblables, lieux rocheux à Nantes, à Toulon et en Corse. C'est une acquisition nouvelle non seulement pour la flore du Valais mais pour la flore suisse.

H. JACCARD.